

# Wiskunde logica

Werkcollege 11

Jolien Oomens

2 mei 2017



# Opgave 1

- (a) Geef een  $S \subseteq \mathcal{P}(X)$  die geen “upset” is.
- (b) Geef een  $S \subseteq \mathcal{P}(X)$  die wel een upset is maar geen filter.
- (c) Geef een filter  $F$  die geen ultrafilter is.



# Opgave 1

- (a) Geef een  $S \subseteq \mathcal{P}(X)$  die geen “upset” is.
- (b) Geef een  $S \subseteq \mathcal{P}(X)$  die wel een upset is maar geen filter.
- (c) Geef een filter  $F$  die geen ultrafilter is.

(a) Neem  $S = \emptyset$ .



# Opgave 1

- (a) Geef een  $S \subseteq \mathcal{P}(X)$  die geen “upset” is.
- (b) Geef een  $S \subseteq \mathcal{P}(X)$  die wel een upset is maar geen filter.
- (c) Geef een filter  $F$  die geen ultrafilter is.

- (a) Neem  $S = \emptyset$ .
- (b) Kies verschillende  $x, y \in X$  en definieer

$$S = \{A \subseteq X : x \in A \vee y \in A\}.$$



# Opgave 1

- (a) Geef een  $S \subseteq \mathcal{P}(X)$  die geen “upset” is.
- (b) Geef een  $S \subseteq \mathcal{P}(X)$  die wel een upset is maar geen filter.
- (c) Geef een filter  $F$  die geen ultrafilter is.

- (a) Neem  $S = \emptyset$ .
- (b) Kies verschillende  $x, y \in X$  en definieer

$$S = \{A \subseteq X : x \in A \vee y \in A\}.$$

Dan geldt niet dat  $A, B \in S \implies A \cap B \in S$ .



# Opgave 1

- (a) Geef een  $S \subseteq \mathcal{P}(X)$  die geen “upset” is.
- (b) Geef een  $S \subseteq \mathcal{P}(X)$  die wel een upset is maar geen filter.
- (c) Geef een filter  $F$  die geen ultrafilter is.

- (a) Neem  $S = \emptyset$ .
- (b) Kies verschillende  $x, y \in X$  en definieer

$$S = \{A \subseteq X : x \in A \vee y \in A\}.$$

Dan geldt niet dat  $A, B \in S \implies A \cap B \in S$ .

- (c) De co-eindige filter  $F = \{A \subseteq X : X \setminus A \text{ is eindig}\}$ . Voor bijvoorbeeld  $X = \mathbb{R}$  en  $A = \mathbb{R}_{\geq 0}$  geldt  $A \notin F$  en  $X \setminus A \notin F$ .



## Opgave 2(a)

Bewijs dat een niet-principieel ultrafilter op  $(\mathcal{P}(\mathbb{N}), \subseteq)$  geen eindige verzameling bevat.



## Opgave 2(a)

Bewijs dat een niet-principieel ultrafilter op  $(\mathcal{P}(\mathbb{N}), \subseteq)$  geen eindige verzameling bevat.

Zij  $F$  een niet-principieel ultrafilter van  $(\mathcal{P}(\mathbb{N}), \subseteq)$  en stel dat een eindige verzameling  $A = \{a_1, \dots, a_n\} \in F$ .





## Opgave 2(a)

Bewijs dat een niet-principieel ultrafilter op  $(\mathcal{P}(\mathbb{N}), \subseteq)$  geen eindige verzameling bevat.

Zij  $F$  een niet-principieel ultrafilter van  $(\mathcal{P}(\mathbb{N}), \subseteq)$  en stel dat een eindige verzameling  $A = \{a_1, \dots, a_n\} \in F$ . Definieer  $B_1 = X \setminus \{a_1\}$ .



## Opgave 2(a)

Bewijs dat een niet-principieel ultrafilter op  $(\mathcal{P}(\mathbb{N}), \subseteq)$  geen eindige verzameling bevat.

Zij  $F$  een niet-principieel ultrafilter van  $(\mathcal{P}(\mathbb{N}), \subseteq)$  en stel dat een eindige verzameling  $A = \{a_1, \dots, a_n\} \in F$ . Definieer  $B_1 = X \setminus \{a_1\}$ . We weten dat  $B_1 \in F$ , want  $\{a_1\} \notin F$



## Opgave 2(a)

Bewijs dat een niet-principieel ultrafilter op  $(\mathcal{P}(\mathbb{N}), \subseteq)$  geen eindige verzameling bevat.

Zij  $F$  een niet-principieel ultrafilter van  $(\mathcal{P}(\mathbb{N}), \subseteq)$  en stel dat een eindige verzameling  $A = \{a_1, \dots, a_n\} \in F$ . Definieer  $B_1 = X \setminus \{a_1\}$ . We weten dat  $B_1 \in F$ , want  $\{a_1\} \notin F$  omdat  $F$  niet principieel is.



## Opgave 2(a)

Bewijs dat een niet-principieel ultrafilter op  $(\mathcal{P}(\mathbb{N}), \subseteq)$  geen eindige verzameling bevat.

Zij  $F$  een niet-principieel ultrafilter van  $(\mathcal{P}(\mathbb{N}), \subseteq)$  en stel dat een eindige verzameling  $A = \{a_1, \dots, a_n\} \in F$ . Definieer  $B_1 = X \setminus \{a_1\}$ . We weten dat  $B_1 \in F$ , want  $\{a_1\} \notin F$  omdat  $F$  niet principieel is. Nu zien we dat

$$X \setminus A = B_1 \cap \dots \cap B_n \in F$$



## Opgave 2(a)

Bewijs dat een niet-principieel ultrafilter op  $(\mathcal{P}(\mathbb{N}), \subseteq)$  geen eindige verzameling bevat.

Zij  $F$  een niet-principieel ultrafilter van  $(\mathcal{P}(\mathbb{N}), \subseteq)$  en stel dat een eindige verzameling  $A = \{a_1, \dots, a_n\} \in F$ . Definieer  $B_1 = X \setminus \{a_1\}$ . We weten dat  $B_1 \in F$ , want  $\{a_1\} \notin F$  omdat  $F$  niet principieel is. Nu zien we dat

$$X \setminus A = B_1 \cap \dots \cap B_n \in F$$

dus ook  $(X \setminus A) \cap A = \emptyset \in F$



## Opgave 2(a)

Bewijs dat een niet-principieel ultrafilter op  $(\mathcal{P}(\mathbb{N}), \subseteq)$  geen eindige verzameling bevat.

Zij  $F$  een niet-principieel ultrafilter van  $(\mathcal{P}(\mathbb{N}), \subseteq)$  en stel dat een eindige verzameling  $A = \{a_1, \dots, a_n\} \in F$ . Definieer  $B_1 = X \setminus \{a_1\}$ . We weten dat  $B_1 \in F$ , want  $\{a_1\} \notin F$  omdat  $F$  niet principieel is. Nu zien we dat

$$X \setminus A = B_1 \cap \dots \cap B_n \in F$$

dus ook  $(X \setminus A) \cap A = \emptyset \in F$  en dat geeft een tegenspraak met de aanname dat  $F \neq \mathcal{P}(\mathbb{N})$ .



## Opgave 2(b)

Bewijs dat voor een filter  $F$  en een  $U \subseteq \mathbb{N}$  de verzameling  $F' = \{V \subseteq \mathbb{N} : A \cap U \subseteq V \text{ voor een } A \in F\}$  een filter is.



## Opgave 2(b)

Bewijs dat voor een filter  $F$  en een  $U \subseteq \mathbb{N}$  de verzameling  $F' = \{V \subseteq \mathbb{N} : A \cap U \subseteq V \text{ voor een } A \in F\}$  een filter is.

Een *filter* in  $\mathbb{N}$  is een collectie  $F \subseteq \mathcal{P}(\mathbb{N})$  zodat

- 1  $A \in F$  en  $B \in F \implies A \cap B \in F$
- 2  $A \in F$  en  $A \subseteq B \implies B \in F$ .





## Opgave 2(b)

Bewijs dat voor een filter  $F$  en een  $U \subseteq \mathbb{N}$  de verzameling  $F' = \{V \subseteq \mathbb{N} : A \cap U \subseteq V \text{ voor een } A \in F\}$  een filter is.

Een *filter* in  $\mathbb{N}$  is een collectie  $F \subseteq \mathcal{P}(\mathbb{N})$  zodat

- 1  $A \in F$  en  $B \in F \implies A \cap B \in F$
- 2  $A \in F$  en  $A \subseteq B \implies B \in F$ .

Neem  $C, D \in F'$ .



## Opgave 2(b)

Bewijs dat voor een filter  $F$  en een  $U \subseteq \mathbb{N}$  de verzameling  $F' = \{V \subseteq \mathbb{N} : A \cap U \subseteq V \text{ voor een } A \in F\}$  een filter is.

Een *filter* in  $\mathbb{N}$  is een collectie  $F \subseteq \mathcal{P}(\mathbb{N})$  zodat

- 1  $A \in F$  en  $B \in F \implies A \cap B \in F$
- 2  $A \in F$  en  $A \subseteq B \implies B \in F$ .

Neem  $C, D \in F'$ . Dan zijn er  $A, B \in F$  zodat  $A \cap U \subseteq C$  en  $B \cap U \subseteq D$ .



## Opgave 2(b)

Bewijs dat voor een filter  $F$  en een  $U \subseteq \mathbb{N}$  de verzameling  $F' = \{V \subseteq \mathbb{N} : A \cap U \subseteq V \text{ voor een } A \in F\}$  een filter is.

Een *filter* in  $\mathbb{N}$  is een collectie  $F \subseteq \mathcal{P}(\mathbb{N})$  zodat

- 1  $A \in F$  en  $B \in F \implies A \cap B \in F$
- 2  $A \in F$  en  $A \subseteq B \implies B \in F$ .

Neem  $C, D \in F'$ . Dan zijn er  $A, B \in F$  zodat  $A \cap U \subseteq C$  en  $B \cap U \subseteq D$ . Nu zien we dat

$$(A \cap B) \cap U \subseteq C \cap D,$$

dus  $C \cap D \in F'$ .



## Opgave 2(b)

Bewijs dat voor een filter  $F$  en een  $U \subseteq \mathbb{N}$  de verzameling  $F' = \{V \subseteq \mathbb{N} : A \cap U \subseteq V \text{ voor een } A \in F\}$  een filter is.

Een *filter* in  $\mathbb{N}$  is een collectie  $F \subseteq \mathcal{P}(\mathbb{N})$  zodat

- 1  $A \in F$  en  $B \in F \implies A \cap B \in F$
- 2  $A \in F$  en  $A \subseteq B \implies B \in F$ .

Neem  $C, D \in F'$ . Dan zijn er  $A, B \in F$  zodat  $A \cap U \subseteq C$  en  $B \cap U \subseteq D$ . Nu zien we dat

$$(A \cap B) \cap U \subseteq C \cap D,$$

dus  $C \cap D \in F'$ .

Stel nu dat  $C \in F'$  en  $C \subseteq E$ .



## Opgave 2(b)

Bewijs dat voor een filter  $F$  en een  $U \subseteq \mathbb{N}$  de verzameling  $F' = \{V \subseteq \mathbb{N} : A \cap U \subseteq V \text{ voor een } A \in F\}$  een filter is.

Een *filter* in  $\mathbb{N}$  is een collectie  $F \subseteq \mathcal{P}(\mathbb{N})$  zodat

- 1  $A \in F$  en  $B \in F \implies A \cap B \in F$
- 2  $A \in F$  en  $A \subseteq B \implies B \in F$ .

Neem  $C, D \in F'$ . Dan zijn er  $A, B \in F$  zodat  $A \cap U \subseteq C$  en  $B \cap U \subseteq D$ . Nu zien we dat

$$(A \cap B) \cap U \subseteq C \cap D,$$

dus  $C \cap D \in F'$ .

Stel nu dat  $C \in F'$  en  $C \subseteq E$ . Er is een  $A \in F$  zodat  $A \cap U \subseteq C \subseteq E$ , dus  $E \in F'$ .



## Opgave 2(b)

Bewijs dat voor een filter  $F$  en een  $U \subseteq \mathbb{N}$  de verzameling  $F' = \{V \subseteq \mathbb{N} : A \cap U \subseteq V \text{ voor een } A \in F\}$  een filter is.

Een *filter* in  $\mathbb{N}$  is een collectie  $F \subseteq \mathcal{P}(\mathbb{N})$  zodat

- 1  $A \in F$  en  $B \in F \implies A \cap B \in F$
- 2  $A \in F$  en  $A \subseteq B \implies B \in F$ .

Neem  $C, D \in F'$ . Dan zijn er  $A, B \in F$  zodat  $A \cap U \subseteq C$  en  $B \cap U \subseteq D$ . Nu zien we dat

$$(A \cap B) \cap U \subseteq C \cap D,$$

dus  $C \cap D \in F'$ .

Stel nu dat  $C \in F'$  en  $C \subseteq E$ . Er is een  $A \in F$  zodat  $A \cap U \subseteq C \subseteq E$ , dus  $E \in F'$ .

Het is duidelijk de kleinste extensie.



## Opgave 2(c)

Bewijs dat elke filter  $F \neq \mathcal{P}(\mathbb{N})$  uitgebreid kan worden naar een ultrafilter.



## Opgave 2(c)

Bewijs dat elke filter  $F \neq \mathcal{P}(\mathbb{N})$  uitgebreid kan worden naar een ultrafilter.

Zij  $F \subsetneq \mathcal{P}(\mathbb{N})$  een filter.





## Opgave 2(c)

Bewijs dat elke filter  $F \neq \mathcal{P}(\mathbb{N})$  uitgebreid kan worden naar een ultrafilter.

Zij  $F \subsetneq \mathcal{P}(\mathbb{N})$  een filter. Bekijk de poset

$$V = \{F \subseteq G \subsetneq \mathcal{P}(\mathbb{N}) : G \text{ is een filter}\}.$$



## Opgave 2(c)

Bewijs dat elke filter  $F \neq \mathcal{P}(\mathbb{N})$  uitgebreid kan worden naar een ultrafilter.

Zij  $F \subsetneq \mathcal{P}(\mathbb{N})$  een filter. Bekijk de poset

$$V = \{F \subseteq G \subsetneq \mathcal{P}(\mathbb{N}) : G \text{ is een filter}\}.$$

Zij  $K \subseteq V$  een ketting.



## Opgave 2(c)

Bewijs dat elke filter  $F \neq \mathcal{P}(\mathbb{N})$  uitgebreid kan worden naar een ultrafilter.

Zij  $F \subsetneq \mathcal{P}(\mathbb{N})$  een filter. Bekijk de poset

$$V = \{F \subseteq G \subsetneq \mathcal{P}(\mathbb{N}) : G \text{ is een filter}\}.$$

Zij  $K \subseteq V$  een ketting. Dan is de vereniging  $H = \bigcup_{G \in K} G$  opnieuw een filter.



## Opgave 2(c)

Bewijs dat elke filter  $F \neq \mathcal{P}(\mathbb{N})$  uitgebreid kan worden naar een ultrafilter.

Zij  $F \subsetneq \mathcal{P}(\mathbb{N})$  een filter. Bekijk de poset

$$V = \{F \subseteq G \subsetneq \mathcal{P}(\mathbb{N}) : G \text{ is een filter}\}.$$

Zij  $K \subseteq V$  een ketting. Dan is de vereniging  $H = \bigcup_{G \in K} G$  opnieuw een filter. Omdat  $\emptyset \notin F$  geldt ook  $\emptyset \notin H$ , dus  $H \neq \mathcal{P}(\mathbb{N})$ .



## Opgave 2(c)

Bewijs dat elke filter  $F \neq \mathcal{P}(\mathbb{N})$  uitgebreid kan worden naar een ultrafilter.

Zij  $F \subsetneq \mathcal{P}(\mathbb{N})$  een filter. Bekijk de poset

$$V = \{F \subseteq G \subsetneq \mathcal{P}(\mathbb{N}) : G \text{ is een filter}\}.$$

Zij  $K \subseteq V$  een ketting. Dan is de vereniging  $H = \bigcup_{G \in K} G$  opnieuw een filter. Omdat  $\emptyset \notin F$  geldt ook  $\emptyset \notin H$ , dus  $H \neq \mathcal{P}(\mathbb{N})$ . Deze  $H$  is dus een bovengrens in  $V$ .



## Opgave 2(c)

Bewijs dat elke filter  $F \neq \mathcal{P}(\mathbb{N})$  uitgebreid kan worden naar een ultrafilter.

Zij  $F \subsetneq \mathcal{P}(\mathbb{N})$  een filter. Bekijk de poset

$$V = \{F \subseteq G \subsetneq \mathcal{P}(\mathbb{N}) : G \text{ is een filter}\}.$$

Zij  $K \subseteq V$  een ketting. Dan is de vereniging  $H = \bigcup_{G \in K} G$  opnieuw een filter. Omdat  $\emptyset \notin F$  geldt ook  $\emptyset \notin H$ , dus  $H \neq \mathcal{P}(\mathbb{N})$ . Deze  $H$  is dus een bovengrens in  $V$ . Er is dus een maximaal element  $M$  volgens Zorns lemma.



## Opgave 2(c)

Bewijs dat elke filter  $F \neq \mathcal{P}(\mathbb{N})$  uitgebreid kan worden naar een ultrafilter.

Zij  $F \subsetneq \mathcal{P}(\mathbb{N})$  een filter. Bekijk de poset

$$V = \{F \subseteq G \subsetneq \mathcal{P}(\mathbb{N}) : G \text{ is een filter}\}.$$

Zij  $K \subseteq V$  een ketting. Dan is de vereniging  $H = \bigcup_{G \in K} G$  opnieuw een filter. Omdat  $\emptyset \notin F$  geldt ook  $\emptyset \notin H$ , dus  $H \neq \mathcal{P}(\mathbb{N})$ . Deze  $H$  is dus een bovengrens in  $V$ . Er is dus een maximaal element  $M$  volgens Zorns lemma. Stel dat  $A \notin M$ .



## Opgave 2(c)

Bewijs dat elke filter  $F \neq \mathcal{P}(\mathbb{N})$  uitgebreid kan worden naar een ultrafilter.

Zij  $F \subsetneq \mathcal{P}(\mathbb{N})$  een filter. Bekijk de poset

$$V = \{F \subseteq G \subsetneq \mathcal{P}(\mathbb{N}) : G \text{ is een filter}\}.$$

Zij  $K \subseteq V$  een ketting. Dan is de vereniging  $H = \bigcup_{G \in K} G$  opnieuw een filter. Omdat  $\emptyset \notin F$  geldt ook  $\emptyset \notin H$ , dus  $H \neq \mathcal{P}(\mathbb{N})$ . Deze  $H$  is dus een bovengrens in  $V$ . Er is dus een maximaal element  $M$  volgens Zorns lemma. Stel dat  $A \notin M$ . Er geldt

$$M \subsetneq M \cup \{A\}$$





## Opgave 2(c)

Bewijs dat elke filter  $F \neq \mathcal{P}(\mathbb{N})$  uitgebreid kan worden naar een ultrafilter.

Zij  $F \subsetneq \mathcal{P}(\mathbb{N})$  een filter. Bekijk de poset

$$V = \{F \subseteq G \subsetneq \mathcal{P}(\mathbb{N}) : G \text{ is een filter}\}.$$

Zij  $K \subseteq V$  een ketting. Dan is de vereniging  $H = \bigcup_{G \in K} G$  opnieuw een filter. Omdat  $\emptyset \notin F$  geldt ook  $\emptyset \notin H$ , dus  $H \neq \mathcal{P}(\mathbb{N})$ . Deze  $H$  is dus een bovengrens in  $V$ . Er is dus een maximaal element  $M$  volgens Zorns lemma. Stel dat  $A \notin M$ . Er geldt

$$M \subsetneq M \cup \{A\} \subseteq \{V \subseteq \mathbb{N} : B \cap A \subseteq V \text{ voor een } B \in M\} =: M'$$



## Opgave 2(c)

Bewijs dat elke filter  $F \neq \mathcal{P}(\mathbb{N})$  uitgebreid kan worden naar een ultrafilter.

Zij  $F \subsetneq \mathcal{P}(\mathbb{N})$  een filter. Bekijk de poset

$$V = \{F \subseteq G \subsetneq \mathcal{P}(\mathbb{N}) : G \text{ is een filter}\}.$$

Zij  $K \subseteq V$  een ketting. Dan is de vereniging  $H = \bigcup_{G \in K} G$  opnieuw een filter. Omdat  $\emptyset \notin F$  geldt ook  $\emptyset \notin H$ , dus  $H \neq \mathcal{P}(\mathbb{N})$ . Deze  $H$  is dus een bovengrens in  $V$ . Er is dus een maximaal element  $M$  volgens Zorns lemma. Stel dat  $A \notin M$ . Er geldt

$$M \subsetneq M \cup \{A\} \subseteq \{V \subseteq \mathbb{N} : B \cap A \subseteq V \text{ voor een } B \in M\} =: M'$$

dus omdat  $M$  maximaal is moet  $M' = \mathcal{P}(\mathbb{N})$ .



## Opgave 2(c)

Bewijs dat elke filter  $F \neq \mathcal{P}(\mathbb{N})$  uitgebreid kan worden naar een ultrafilter.

Zij  $F \subsetneq \mathcal{P}(\mathbb{N})$  een filter. Bekijk de poset

$$V = \{F \subseteq G \subsetneq \mathcal{P}(\mathbb{N}) : G \text{ is een filter}\}.$$

Zij  $K \subseteq V$  een ketting. Dan is de vereniging  $H = \bigcup_{G \in K} G$  opnieuw een filter. Omdat  $\emptyset \notin F$  geldt ook  $\emptyset \notin H$ , dus  $H \neq \mathcal{P}(\mathbb{N})$ . Deze  $H$  is dus een bovengrens in  $V$ . Er is dus een maximaal element  $M$  volgens Zorns lemma. Stel dat  $A \notin M$ . Er geldt

$$M \subsetneq M \cup \{A\} \subseteq \{V \subseteq \mathbb{N} : B \cap A \subseteq V \text{ voor een } B \in M\} =: M'$$

dus omdat  $M$  maximaal is moet  $M' = \mathcal{P}(\mathbb{N})$ . Er is dus een  $B \in M$  zodat  $B \cap A = \emptyset$ , dus  $\mathbb{N} \setminus A \subseteq B \in M$ .



## Opgave 2(c)

Bewijs dat elke filter  $F \neq \mathcal{P}(\mathbb{N})$  uitgebreid kan worden naar een ultrafilter.

Zij  $F \subsetneq \mathcal{P}(\mathbb{N})$  een filter. Bekijk de poset

$$V = \{F \subseteq G \subsetneq \mathcal{P}(\mathbb{N}) : G \text{ is een filter}\}.$$

Zij  $K \subseteq V$  een ketting. Dan is de vereniging  $H = \bigcup_{G \in K} G$  opnieuw een filter. Omdat  $\emptyset \notin F$  geldt ook  $\emptyset \notin H$ , dus  $H \neq \mathcal{P}(\mathbb{N})$ . Deze  $H$  is dus een bovengrens in  $V$ . Er is dus een maximaal element  $M$  volgens Zorns lemma. Stel dat  $A \notin M$ . Er geldt

$$M \subsetneq M \cup \{A\} \subseteq \{V \subseteq \mathbb{N} : B \cap A \subseteq V \text{ voor een } B \in M\} =: M'$$

dus omdat  $M$  maximaal is moet  $M' = \mathcal{P}(\mathbb{N})$ . Er is dus een  $B \in M$  zodat  $B \cap A = \emptyset$ , dus  $\mathbb{N} \setminus A \subseteq B \in M$ . Dit laat zien dat voor alle  $A \subseteq \mathbb{N}$  we  $A \in M$  of  $\mathbb{N} \setminus A \in M$  hebben, dus  $M$  is een ultrafilter.



## Opgave 2

(d) Bewijs dat  $\{A \subseteq \mathbb{N} : \mathbb{N} \setminus A \text{ is eindig}\}$  een filter is.

(e) Bewijs dat er een niet-principieel ultrafilter bestaat op  $(\mathcal{P}(\mathbb{N}), \subseteq)$



## Opgave 2

(d) Bewijs dat  $\{A \subseteq \mathbb{N} : \mathbb{N} \setminus A \text{ is eindig}\}$  een filter is.

(e) Bewijs dat er een niet-principieel ultrafilter bestaat op  $(\mathcal{P}(\mathbb{N}), \subseteq)$

(d) Analoog aan (b).



## Opgave 2

(d) Bewijs dat  $\{A \subseteq \mathbb{N} : \mathbb{N} \setminus A \text{ is eindig}\}$  een filter is.

(e) Bewijs dat er een niet-principieel ultrafilter bestaat op  $(\mathcal{P}(\mathbb{N}), \subseteq)$

(d) Analoog aan (b).

(e) We breiden het filter uit (d) uit naar een ultrafilter  $F$ . We willen nu bewijzen dat deze  $F$  niet-principieel is.



## Opgave 2

(d) Bewijs dat  $\{A \subseteq \mathbb{N} : \mathbb{N} \setminus A \text{ is eindig}\}$  een filter is.

(e) Bewijs dat er een niet-principieel ultrafilter bestaat op  $(\mathcal{P}(\mathbb{N}), \subseteq)$

(d) Analoog aan (b).

(e) We breiden het filter uit (d) uit naar een ultrafilter  $F$ . We willen nu bewijzen dat deze  $F$  niet-principieel is. Merk op dat er geen eindige verzamelingen in  $F$  kunnen zitten,





## Opgave 2

(d) Bewijs dat  $\{A \subseteq \mathbb{N} : \mathbb{N} \setminus A \text{ is eindig}\}$  een filter is.

(e) Bewijs dat er een niet-principieel ultrafilter bestaat op  $(\mathcal{P}(\mathbb{N}), \subseteq)$

(d) Analoog aan (b).

(e) We breiden het filter uit (d) uit naar een ultrafilter  $F$ . We willen nu bewijzen dat deze  $F$  niet-principieel is. Merk op dat er geen eindige verzamelingen in  $F$  kunnen zitten, dus in het bijzonder kunnen er ook geen singletons  $\{x\}$  in zitten.



## Opgave 2

(d) Bewijs dat  $\{A \subseteq \mathbb{N} : \mathbb{N} \setminus A \text{ is eindig}\}$  een filter is.

(e) Bewijs dat er een niet-principieel ultrafilter bestaat op  $(\mathcal{P}(\mathbb{N}), \subseteq)$

(d) Analoog aan (b).

(e) We breiden het filter uit (d) uit naar een ultrafilter  $F$ . We willen nu bewijzen dat deze  $F$  niet-principieel is. Merk op dat er geen eindige verzamelingen in  $F$  kunnen zitten, dus in het bijzonder kunnen er ook geen singletons  $\{x\}$  in zitten. Dit laat zien dat  $F$  niet van de vorm  $\{A \subseteq \mathbb{N} : x \in A\}$  is.



## Opgave 3

Zij  $\mathfrak{A}_1, \dots, \mathfrak{A}_n$   $S$ -structuren met  $S = \{R\}$ . Zij  $F_n$  het principiele ultrafilter van  $(\mathcal{P}(\mathbb{N}), \subseteq)$  gegenereerd door  $n \in \mathbb{N}$ . Bewijs dat  $(\prod_{i \in \mathbb{N}} A_i) / F_n \cong A_n$ .



## Opgave 3

Zij  $\mathfrak{A}_1, \dots, \mathfrak{A}_n$   $S$ -structuren met  $S = \{R\}$ . Zij  $F_n$  het principiële ultrafilter van  $(\mathcal{P}(\mathbb{N}), \subseteq)$  gegenereerd door  $n \in \mathbb{N}$ . Bewijs dat  $(\prod_{i \in \mathbb{N}} A_i) / F_n \cong A_n$ .

We hebben

$$F_n = \{A \subseteq \mathbb{N} : n \in A\},$$



## Opgave 3

Zij  $\mathfrak{A}_1, \dots, \mathfrak{A}_n$   $S$ -structuren met  $S = \{R\}$ . Zij  $F_n$  het principiële ultrafilter van  $(\mathcal{P}(\mathbb{N}), \subseteq)$  gegenereerd door  $n \in \mathbb{N}$ . Bewijs dat  $(\prod_{i \in \mathbb{N}} A_i) / F_n \cong A_n$ .

We hebben

$$F_n = \{A \subseteq \mathbb{N} : n \in A\},$$

dus

$$a \sim b$$



## Opgave 3

Zij  $\mathfrak{A}_1, \dots, \mathfrak{A}_n$   $S$ -structuren met  $S = \{R\}$ . Zij  $F_n$  het principiële ultrafilter van  $(\mathcal{P}(\mathbb{N}), \subseteq)$  gegenereerd door  $n \in \mathbb{N}$ . Bewijs dat  $(\prod_{i \in \mathbb{N}} A_i) / F_n \cong A_n$ .

We hebben

$$F_n = \{A \subseteq \mathbb{N} : n \in A\},$$

dus

$$a \sim b \iff \{i \in \mathbb{N} : a(i) = b(i)\} \in F_n$$



## Opgave 3

Zij  $\mathfrak{A}_1, \dots, \mathfrak{A}_n$   $S$ -structuren met  $S = \{R\}$ . Zij  $F_n$  het principiële ultrafilter van  $(\mathcal{P}(\mathbb{N}), \subseteq)$  gegenereerd door  $n \in \mathbb{N}$ . Bewijs dat  $(\prod_{i \in \mathbb{N}} A_i) / F_n \cong A_n$ .

We hebben

$$F_n = \{A \subseteq \mathbb{N} : n \in A\},$$

dus

$$\begin{aligned} a \sim b &\iff \{i \in \mathbb{N} : a(i) = b(i)\} \in F_n \\ &\iff n \in \{i \in \mathbb{N} : a(i) = b(i)\} \end{aligned}$$



## Opgave 3

Zij  $\mathfrak{A}_1, \dots, \mathfrak{A}_n$   $S$ -structuren met  $S = \{R\}$ . Zij  $F_n$  het principiële ultrafilter van  $(\mathcal{P}(\mathbb{N}), \subseteq)$  gegenereerd door  $n \in \mathbb{N}$ . Bewijs dat  $(\prod_{i \in \mathbb{N}} A_i) / F_n \cong A_n$ .

We hebben

$$F_n = \{A \subseteq \mathbb{N} : n \in A\},$$

dus

$$\begin{aligned} a \sim b &\iff \{i \in \mathbb{N} : a(i) = b(i)\} \in F_n \\ &\iff n \in \{i \in \mathbb{N} : a(i) = b(i)\} \iff a(n) = b(n). \end{aligned}$$





## Opgave 3

Zij  $\mathfrak{A}_1, \dots, \mathfrak{A}_n$   $S$ -structuren met  $S = \{R\}$ . Zij  $F_n$  het principiële ultrafilter van  $(\mathcal{P}(\mathbb{N}), \subseteq)$  generereerd door  $n \in \mathbb{N}$ . Bewijs dat  $(\prod_{i \in \mathbb{N}} A_i) / F_n \cong A_n$ .

We hebben

$$F_n = \{A \subseteq \mathbb{N} : n \in A\},$$

dus

$$\begin{aligned} a \sim b &\iff \{i \in \mathbb{N} : a(i) = b(i)\} \in F_n \\ &\iff n \in \{i \in \mathbb{N} : a(i) = b(i)\} \iff a(n) = b(n). \end{aligned}$$

De afbeelding  $f: (\prod_{i \in \mathbb{N}} A_i) / F_n \rightarrow A_n$  gegeven door  $f(a) = a(n)$  is dus een isomorfisme.



## Opgave 4

- (a) Bewijs dat de klasse van lineaire ordes gesloten is onder ultraproducten.
- (b) Bewijs dat de klasse van eindige posets niet elementair is.



## Opgave 4

- (a) Bewijs dat de klasse van lineaire ordes gesloten is onder ultraproducten.
- (b) Bewijs dat de klasse van eindige posets niet elementair is.
  - (a) We weten dat er een  $\varphi$  is die precies weergeeft dat een structuur een lineaire orde is.



## Opgave 4

- (a) Bewijs dat de klasse van lineaire ordes gesloten is onder ultraproducten.
- (b) Bewijs dat de klasse van eindige posets niet elementair is.
- (a) We weten dat er een  $\varphi$  is die precies weergeeft dat een structuur een lineaire orde is. Omdat elke  $A_i \models \varphi$  geldt ook  $\prod_{i \in I} A_i / \sim \models \varphi$  volgens Łoś' stelling.



## Opgave 4

- (a) Bewijs dat de klasse van lineaire ordes gesloten is onder ultraproducten.
- (b) Bewijs dat de klasse van eindige posets niet elementair is.
- (a) We weten dat er een  $\varphi$  is die precies weergeeft dat een structuur een lineaire orde is. Omdat elke  $A_i \models \varphi$  geldt ook  $\prod_{i \in I} A_i / \sim \models \varphi$  volgens Łoś' stelling.
- (b) Stel van wel, dan moet de eigenschap behouden zijn onder het nemen van een ultraproduct.



## Opgave 4

- (a) Bewijs dat de klasse van lineaire ordes gesloten is onder ultraproducten.
- (b) Bewijs dat de klasse van eindige posets niet elementair is.
- (a) We weten dat er een  $\varphi$  is die precies weergeeft dat een structuur een lineaire orde is. Omdat elke  $A_i \models \varphi$  geldt ook  $\prod_{i \in I} A_i / \sim \models \varphi$  volgens Łoś' stelling.
- (b) Stel van wel, dan moet de eigenschap behouden zijn onder het nemen van een ultraproduct. Neem  $A_i = \{1, \dots, i\}$  en zij  $F$  een ultrafilter die de co-eindige filter omvat.



## Opgave 4

- (a) Bewijs dat de klasse van lineaire ordes gesloten is onder ultraproducten.  
(b) Bewijs dat de klasse van eindige posets niet elementair is.

- (a) We weten dat er een  $\varphi$  is die precies weergeeft dat een structuur een lineaire orde is. Omdat elke  $A_i \models \varphi$  geldt ook  $\prod_{i \in I} A_i / \sim \models \varphi$  volgens Łoś' stelling.
- (b) Stel van wel, dan moet de eigenschap behouden zijn onder het nemen van een ultraproduct. Neem  $A_i = \{1, \dots, i\}$  en zij  $F$  een ultrafilter die de co-eindige filter omvat. Nu is

$$(\{1\} \times \{1, 2\} \times \{1, 2, 3\} \times \dots) / F$$

oneindig groot



## Opgave 4

- (a) Bewijs dat de klasse van lineaire ordes gesloten is onder ultraproducten.  
(b) Bewijs dat de klasse van eindige posets niet elementair is.

- (a) We weten dat er een  $\varphi$  is die precies weergeeft dat een structuur een lineaire orde is. Omdat elke  $A_i \models \varphi$  geldt ook  $\prod_{i \in I} A_i / \sim \models \varphi$  volgens Łoś' stelling.
- (b) Stel van wel, dan moet de eigenschap behouden zijn onder het nemen van een ultraproduct. Neem  $A_i = \{1, \dots, i\}$  en zij  $F$  een ultrafilter die de co-eindige filter omvat. Nu is

$$(\{1\} \times \{1, 2\} \times \{1, 2, 3\} \times \dots) / F$$

oneindig groot, want de rijtjes  $a^n(i) = \min(i, n)$  zijn allemaal verschillend in het ultraproduct:





## Opgave 4

- (a) Bewijs dat de klasse van lineaire ordes gesloten is onder ultraproducten.  
(b) Bewijs dat de klasse van eindige posets niet elementair is.

- (a) We weten dat er een  $\varphi$  is die precies weergeeft dat een structuur een lineaire orde is. Omdat elke  $A_i \models \varphi$  geldt ook  $\prod_{i \in I} A_i / \sim \models \varphi$  volgens Łoś' stelling.
- (b) Stel van wel, dan moet de eigenschap behouden zijn onder het nemen van een ultraproduct. Neem  $A_i = \{1, \dots, i\}$  en zij  $F$  een ultrafilter die de co-eindige filter omvat. Nu is

$$(\{1\} \times \{1, 2\} \times \{1, 2, 3\} \times \dots) / F$$

oneindig groot, want de rijtjes  $a^n(i) = \min(i, n)$  zijn allemaal verschillend in het ultraproduct:

$$a^1 = 1, 1, 1, 1, 1, 1, \dots$$

$$a^2 = 1, 2, 2, 2, 2, 2, \dots$$

$$a^3 = 1, 2, 3, 3, 3, 3, \dots$$

